

CBS

Colegio Bautista Shalom



**Matemática IV
Cuarto BACL
Tercer Bimestre**

Contenidos

GEOMETRÍA ANALÍTICA

- ✓ ECUACIONES DE LAS SECCIONES CÓNICAS.
 - CIRCUNFERENCIA.
 - PARÁBOLA.
 - ELIPSE.
 - HIPÉRBOLA.

NOTA: conforme avances en tu aprendizaje, encontrarás ejercicios a resolver. Sigue las instrucciones de tu catedrático(a).

Al final encontrarás un EJERCICIO GENERAL que contiene una miscelánea de ejercicios de los temas vistos durante el bimestre. Este ejercicio le puede servir a tu catedrático(a) como un proyecto final o examen de bimestre. Si lo considera así debes seguir sus instrucciones para realizarlo.

GEOMETRÍA ANALÍTICA


Es una rama de la geometría que estudia los cuerpos geométricos a través de un sistema de coordenadas. De ese modo, se pueden expresar las figuras como ecuaciones algebraicas.

La geometría analítica localiza, en un plano bidimensional, cada uno de los puntos que forman una figura. Todo ello, en función de dos rectas, el **eje de abscisas** (eje horizontal **X**) y de las **ordenadas** (eje vertical **Y**).

Los ejes **X** e **Y** son perpendiculares. Es decir, forman cuatro ángulos de 90° (grados) en su intersección. De ese modo, se trabaja en un sistema de coordenadas que se conoce como **plano cartesiano**.

Cada punto del plano posee una coordenada del siguiente tipo (**X**, **Y**). Así, el punto (3,8) es aquel que nace de unir el punto 3 en el eje horizontal y el punto 8 en el eje vertical.

Un dato importante a mencionar es que se considera al filósofo René Descartes como el padre de la geometría. Especialmente, tras la publicación de su obra *El Discurso del Método*, y particularmente, en uno de sus apéndices llamado "La Géométrie".



Para simplificar, lo que propone la geometría analítica es unir el álgebra con la geometría o, para ser más precisos, aplicar la primera disciplina en la segunda, como quedará más claro a continuación.


Ejemplos de geometría analítica

Al aplicar la geometría analítica podemos describir una figura geométrica mediante una ecuación algebraica.

En el caso de una recta, por ejemplo, podemos definirla como una **ecuación** de primer grado como la siguiente:

$$y = xm + b$$

En la ecuación mostrada, **Y** es la coordenada en el eje de las ordenadas (vertical), **X** es la coordenada en el eje de las abscisas (horizontal), **m** es la pendiente (inclinación) que forma la recta respecto al eje de las abscisas, y **b** es el punto de la recta que corta el eje de las ordenadas.



Por ejemplo, podemos graficar la recta con la ecuación: $y = -0,5x + 3$

Sabiendo las ecuaciones de dos rectas, podemos saber, por ejemplo, si son paralelas. Es decir, no se cruzan en ningún punto. En este caso, la pendiente (**m**) en ambas ecuaciones debería ser la misma, siendo distinto solo el punto en el que cortan los ejes **X** e **Y**.


Asimismo, si las rectas no son paralelas, siempre se puede hallar el punto en el que se cruzan (a menos que sean rectas coincidentes o idénticas).

Otro tipo de figuras geométricas que pueden describirse mediante ecuaciones son los círculos. En este caso tendremos una ecuación de segundo grado, como la siguiente:


$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

Para explicar la ecuación de arriba, consideremos que su centro es el punto (a, b) del plano cartesiano. Asimismo, cualquiera de los puntos de la circunferencia está en la coordenada (x, y) , y el radio de la figura es r .

Ejemplo de circunferencia:



En esta línea, las paráboles tienen la siguiente forma: $y = ax^2 + bx + c$.




ECUACIONES DE LAS SECCIONES CÓNICAS

Las cónicas o también llamadas secciones cónicas se presentan cuando un doble cono se interseca con planos. No estamos interesados en los lugares geométricos de \mathbb{R}^3 , estudiaremos las curvas de intersección de estas superficies en \mathbb{R}^2 .

Se obtendrán las ecuaciones de definiciones directamente en el plano cartesiano. Descubriremos que la ecuación de una cónica tiene la forma:

$$\text{Con } A \neq 0 \text{ ó } B \neq 0 \text{ ó ambos, y } E = 0 \quad Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + Exy + F = 0$$



CIRCUNFERENCIA

Definición: Sea O un punto del plano y sea "r" un número real positivo. Se define la circunferencia como el conjunto de puntos $P(x, y)$ tal que la distancia de P a O es igual a "r". Es decir:

$$\text{Circunferencia} = \{P(x, y) / d(P, O) = r\}$$

Al punto "O" se le denomina centro de la circunferencia y a "r" se le denomina radio de la circunferencia.

Ecuación canónica de la circunferencia:


Supongamos que O tiene coordenadas (h, k) .

La distancia entre los puntos $P(x, y)$ de la circunferencia y el punto $C(h, k)$, la cual denotamos como "r", está dada por:

$$r = \sqrt{(x - h)^2 + (y - k)^2}$$

Entonces, tenemos:


$$(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2 \quad \text{Ecuación canónica de una circunferencia. Para } r^2 > 0.$$



Un tipo especial de circunferencia es aquella que tiene por ecuación:

$$x^2 + y^2 = r^2$$

Es decir, una circunferencia con centro $O(0, 0)$, el origen:



Despejando y , obtenemos las ecuaciones de las semicircunferencias, superior e inferior:

Ejemplo

Hallar la ecuación canónica de la circunferencia que tiene centro el punto $O(4,2)$ y radio 3

SOLUCIÓN:

Reemplazando en $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ tenemos:

$$(x-4)^2 + (y-2)^2 = 3^2$$

$$(x-4)^2 + (y-2)^2 = 9$$

La ecuación canónica pedida.

Ahora, en la ecuación canónica del ejemplo anterior $(x-4)^2 + (y-2)^2 = 3^2$, al elevar al cuadrado y reducir términos semejantes se obtiene:

$$x^2 - 4x + 16 + y^2 - 4y + 4 = 9$$

$$x^2 + y^2 - 4x - 4y + 16 + 11 = 0$$

Se puede decir, entonces que la ecuación de una circunferencia tendrá la forma:

$$x^2 + y^2 + C'x + D'y + F' = 0$$

O, también:

$$Ax^2 + Ay^2 + Cx + Dy + F = 0$$

Esta última ecuación es llamada **ECUACIÓN GENERAL DE UNA CIRCUNFERENCIA**.

Por tanto, si nuestra intención fuese dibujar la circunferencia o descubrirle sus elementos (centro y radio) a partir de la ecuación general, deberíamos llevar la ecuación a su forma canónica completando trinomios cuadrados perfectos.

Ejemplo

Graficar la circunferencia que tiene por ecuación $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$


Solución

La ecuación general dada, la transformamos a la ecuación canónica completando cuadrados

$$(x^2 - 4x + 4) + (y^2 + 6y + 9) = 12 + 4 + 9$$

$$(x-2)^2 + (y+3)^2 = 25$$

Tenemos una circunferencia de radio $r = 5$ y centro $C(2, -3)$



No toda ecuación de la forma $Ax^2 + Ay^2 + Cx + Dy + F = 0$ representará una circunferencia.

Si en el proceso de llevarla a la forma canónica se obtiene $r^2 = 0$, es decir que resulta $(x-h)^2 + (y-k)^2$, el lugar geométrico es el punto $O(h, k)$.

¿Por qué?

Si $r^2 < 0$, la ecuación no representa lugar geométrico. ¿Por qué?

Ejemplo

Hallar la ecuación canónica de la circunferencia que contiene a los puntos $(1,2)$,

$(3,0)$ y $(3+\sqrt{3}, 3)$

Solución:

Si los puntos pertenecen a la circunferencia deben satisfacer su ecuación. En este caso empleamos la ecuación general $x^2 + y^2 + C'x + D'y + F' = 0$.

Reemplazando las coordenadas de los puntos dados:

$$\begin{cases} 1^2 + 2^2 + C'(1) + D(2) + F' = 0 \\ 3^2 + 0^2 + C'(3) + D(0) + F' = 0 \\ (3+\sqrt{3})^2 + 3^2 + C'(3+\sqrt{3}) + D'(3) + F' = 0 \end{cases}$$

Resolviendo simultáneamente el sistema:

$$\begin{cases} C' + 2D + F' = -5 \\ 3C' + F' = -9 \\ (3+\sqrt{3})C' + 3D' + F' = -(3+\sqrt{3})^2 - 9 \end{cases}$$

En la segunda ecuación se obtiene $F' = -9 - 3C'$

Reemplazando en la primera:

$$\begin{aligned} C' + 2D' + F' &= -5 \\ C' + 2D' - 9 - 3C' &= -5 \\ -2C' + 2D' &= 4 \\ D' &= 2 + C' \end{aligned}$$

Reemplazando D' y F' en la tercera ecuación:

$$\begin{aligned} (3+\sqrt{3})C' + 3D' + F' &= -(3+\sqrt{3})^2 - 9 \\ (3+\sqrt{3})C' + 3(2+C') + (-9-3C') &= -(3+\sqrt{3})^2 - 9 \\ 3C' + \sqrt{3}C' + 6 + 3C' - 9 - 3C' &= -9 - 6\sqrt{3} - 3 - 9 \\ \sqrt{3}C' + 3C' &= -18 - 6\sqrt{3} \\ (\sqrt{3} + 3)C' &= -6(3 + \sqrt{3}) \\ C' &= -6 \end{aligned}$$

Entonces:

$$\begin{array}{l|l} D' = 2 + C' & F' = -9 - 3C' \\ = 2 - 6 & = -9 - 3(-6) \\ \boxed{D' = -4} & \boxed{F' = 9} \end{array}$$

Por tanto, la ecuación general de la circunferencia sería:

$$x^2 + y^2 - 6x - 4y + 9 = 0$$

Agrupando y completando cuadrados, se obtiene la ecuación canónica:

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 6x - 4y + 9 &= 0 \\ (x^2 - 6x + 9) + (y^2 - 4y + 4) &= -9 + 9 + 4 \\ (x - 3)^2 + (y - 2)^2 &= 4 \end{aligned}$$

EJERCICIO 01. Realiza lo que se te indica en cada uno de los ítems. En tu cuaderno de apuntes debes desollar tus procedimientos con lápiz y al final escribir tu respuesta con lapicero color negro.

1. Grafique el lugar geométrico definido por cada una de las siguientes ecuaciones:

a. $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$

b. $2x^2 + 2y^2 - 2x - 2y + 9 = 0$

b. $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 13 = 0$

c. $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 17 = 0$

2. Determine la ecuación de la circunferencia que contiene a los puntos $A(0,6)$, $B(1,5)$ y cuyo centro se encuentra sobre la recta definida por la ecuación $x + y = -1$.

3. Determine la ecuación general de una circunferencia tangente a la recta definida por la ecuación $2x - 3y + 5 = 0$, y está centrada en el punto $(-1, -2)$.

4. La intersección de las rectas $L_1 : 2x - y + 3 = 0$ y $L_2 : 4x + y - 2 = 0$ es el centro de una circunferencia que es tangente a la recta $L_3 : x - y + 1 = 0$. Determine la ecuación de la circunferencia.

5. Determine la longitud de la cuerda de la circunferencia que tiene como ecuación $x^2 + y^2 - 6x - 14y - 111 = 0$ conociendo que el punto medio de dicha cuerda tiene coordenadas $\left(\frac{17}{2}, \frac{7}{2}\right)$.

PARÁBOLA

Definición:

Sea l una recta y sea F un punto. La parábola se define como el conjunto de puntos $P(x,y)$ tal que su distancia al punto F es igual a su distancia a la recta l . Es decir:

$$\text{Parábola} = \{P(x,y) / d(P,F) = d(p,l)\}$$

Al punto F se le denomina **foco de la parábola** y a la recta l se le denomina **directriz de la parábola**.

Ecuación canónica:

Supongamos que F tiene coordenadas $(0, p)$ y la recta l tiene ecuación $y = p$ con $p > 0$. Observa la gráfica:

Observe que $d(P,F) = \sqrt{(x-0)^2 + (y-p)^2}$ y que $d(P,l) = |y+p|$.

Igualando distancias y resolviendo:


$$d(P,F) = d(P,l)$$

$$\sqrt{(x-0)^2 + (y-p)^2} = |y+p|$$

$$(\sqrt{(x-0)^2 + (y-p)^2})^2 = (y+p)^2$$

$$x^2 + y^2 - 2py + p^2 = y^2 + 2py + p^2$$

$$x^2 = 4py$$



Al punto V se le denomina **vértice de la parábola**, en este caso tiene coordenadas

$(0, 0)$. A la recta perpendicular a la directriz, que contiene al vértice y al foco, se le denomina **Eje Focal**. Observa que para la parábola anterior el eje focal es el eje y .


Observa además que la parábola es cóncava hacia arriba.

Al segmento de recta perpendicular al eje focal que pasa por el foco y que tiene como extremos los dos puntos de la parábola, se denomina **Lado Recto** y tiene una medida de $4p$. ¡Demuestre!

Suponga ahora que el vértice no es el origen, que tenemos $V(h, k)$, entonces su ecuación sería:

$$(x - h)^2 = 4p(y - k)$$


Y su gráfico sería:



Para otros casos, tenemos:


$$(x - h)^2 = -4p(y - k)$$

Una parábola con **eje focal vertical**, pero **cóncava hacia abajo**.




Si la parábola tiene ecuación $(y - k)^2 = 4p(x - h)$.

Su **eje focal** será **horizontal** y además será **cóncava hacia la derecha**.



Si la parábola tiene ecuación $(y - k)^2 = -4p(x - h)$.

Su **eje focal** será **horizontal**, pero ahora será **cóncava hacia la izquierda**.



La ecuación general de esta cónica será de la forma $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + F = 0$ con $A = 0$ o $B = 0$ pero no ambos. Es decir, tendremos ecuaciones de la forma $Ax^2 + Cx + Dy + F = 0$ o de la forma $By^2 + Cx + Dy + F = 0$, según se la dirección del eje focal.

O más simplemente $x^2 + C'x + D'y + F' = 0$

$$y^2 + C'x + D'y + F' = 0$$

Ejemplo 1

Graficar la parábola que tiene por ecuación $4x^2 - 20x - 24y + 97 = 0$. Indique coordenadas del vértice, coordenadas del foco, ecuación de la recta directriz.

SOLUCIÓN:


Despejando la variable cuadrática para completarle cuadrados y agrupando, tenemos:

$$\begin{aligned} 4x^2 - 20x &= -24y - 97 \\ \frac{4}{4}\left(x^2 - 5x + \frac{25}{4}\right) &= \frac{24}{4}y - \frac{97}{4} + \frac{25}{4} \\ \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 &= 6y - 18 \\ \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 &= 6(y - 3) \end{aligned}$$

Se deduce entonces que:

1. La parábola tiene vértice $V\left(\frac{5}{2}, 3\right)$.
2. El eje focal es paralelo al eje y
3. La parábola es cóncava hacia arriba
4. $p = \frac{3}{2}$ debido a que $6 = 4p$.

Realizando su gráfica tenemos:




Ejemplo 2

Hallar la ecuación general de la parábola que tiene foco el punto de coordenadas $(-3, -2)$ y directriz la recta con ecuación $x = 1$.

SOLUCIÓN

En primer lugar representamos el foco y la directriz en el plano cartesiano.



Concluimos que:

1. El vértice debe tener coordenadas $(-1, -2)$
2. El eje focal es paralelo al eje x
3. La parábola es cóncava hacia la izquierda.
4. $p = 2$, distancia del vértice al foco o distancia del vértice a la directriz.
5. La ecuación de trabajo es $(y - k)^2 = -4p(x - h)$

Bien, reemplazando los valores en la ecuación de trabajo, tenemos:


$$\begin{aligned} (y + 2)^2 &= -4(2)(x + 1) \\ y^2 + 4y + 4 &= -8x - 8 \\ 8x + y^2 + 4y + 12 &= 0 \end{aligned}$$

Ejemplo 3

Un puente colgante de 120m de longitud tiene trayectoria parabólica sostenida por torres de igual altura si la directriz se encuentra en la superficie terrestre y el punto más bajo de cada cable está a 15m de altura de dicha superficie, hallar la altura de las torres.

SOLUCIÓN:

Primero hacemos una representación gráfica de la información proporcionada, trabajando en el plano cartesiano, es mejor poner el vértice en el origen:



La ecuación de la trayectoria sería:

$$\begin{aligned}x^2 &= 4(15)y \\x^2 &= 60y\end{aligned}$$

Utilizando la ecuación de la trayectoria determinamos "y":

$$\begin{aligned}x^2 &= 60y \\60^2 &= 60y \\y &= 60\end{aligned}$$

Por lo tanto la altura de las torres sería:

$$\begin{aligned}h &= y + p \\h &= 60 + 15 \\h &= 75m\end{aligned}$$

Ejemplo 4

Hallar la ecuación de la parábola que tiene eje focal vertical y contiene los puntos $(-1, 5)$, $(3, 1)$ y $(7, 5)$.

SOLUCIÓN:

Ya que tiene eje focal vertical empleamos la ecuación $x^2 + C'x + D'y + F' = 0$
¿Porqué?.

Cómo los puntos pertenecen a la parábola, las coordenadas deben satisfacer su ecuación.

Reemplazando y simplificando:

$$\begin{cases}(-1)^2 + C'(-1) + D'(5) + F' = 0 \\(3)^2 + C'(3) + D'(1) + F' = 0 \\(7)^2 + C'(7) + D'(5) + F' = 0\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}-C' + 5D' + F' = -1 \\3C' + D' + F' = -9 \\7C' + 5D' + F' = -49\end{cases}$$

Resolviendo el sistema simultáneo se obtiene:

$$C' = -6, D' = -4 \text{ y } F' = 13$$

Por tanto la ecuación buscada sería:

$$x^2 - 6x - 4y + 13 = 0$$

EJERCICIO 02. Realiza lo que se te indica en cada uno de los ítems. Desollar tus procedimientos con lápiz y al final escribir tu respuesta con lapicero color negro.

1. Grafique el lugar geométrico definido por cada una de las siguientes ecuaciones: (Indique todos sus elementos).
 - a. $x^2 - 2x - 4y + 1 = 0$
 - b. $2y^2 - 2x - 2y + 9 = 0$
 - c. $y^2 - 4x + 6y + 13 = 0$
 - d. $-x^2 - 4x - 6y + 17 = 0$
2. Determine la ecuación de la parábola cuya directriz es la recta definida por $y = 1$, contiene al punto $(0, 3)$ y la menor distancia entre la parábola y la directriz es igual a 2.
3. Determine la ecuación canónica de la parábola donde la recta directriz tiene la ecuación $y + 2 = 0$ y los extremos del lado recto son los puntos $A(0, 2)$ y $B(8, 2)$.
4. Encuentre la ecuación canónica de la parábola que tiene eje focal vertical y contiene los puntos: $(0, 0), (1, -1), (\frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$

5. Resuelva el problema anterior suponiendo ahora que el eje focal es horizontal.

ELIPSE

Definición:


Sean F_1 y F_2 dos puntos del plano y sea a una constante positiva. La Elipse se define como el conjunto de puntos $P(x,y)$ tales que la suma de su distancia a F_1 con su distancia a F_2 es igual a $2a$. Es decir:

$$\text{Elipse} = \{P(x,y) / d(P, F_1) + d(P, F_2) = 2a\}$$

A F_1 y F_2 se les denomina **focos de la elipse** y "a" representa la medida del **semieje mayor** de la elipse.

Ecuación canónica:

Sea $F_1(-c, 0)$ y $F_2(c, 0)$, observe el gráfico:



De la definición tenemos:

$$\begin{aligned} d(P, F_2) + d(P, F_1) &= 2a \\ \sqrt{(x-c)^2 + (y-0)^2} + \sqrt{(x+c)^2 + (y-0)^2} &= 2a \end{aligned}$$

Dejando un radical, elevando al cuadrado y reduciendo términos semejantes:

$$\begin{aligned} (\sqrt{(x-c)^2 + y^2})^2 &= (2a - \sqrt{(x+c)^2 + y^2})^2 \\ (x-c)^2 + y^2 &= 4a^2 - 4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + (x+c)^2 + y^2 \\ x^2 - 2xc + c^2 + y^2 &= 4a^2 - 4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + x^2 + 2xc + c^2 + y^2 \\ 4a\sqrt{(x+c)^2 + y^2} &= 4a^2 + 4cx \end{aligned}$$

Dividiendo para 4, elevando al cuadrado y reduciendo términos semejantes:

$$\begin{aligned} (a\sqrt{(x+c)^2 + y^2})^2 &= (a^2 + cx)^2 \\ a^2[(x+c)^2 + y^2] &= a^4 + 2a^2c + c^2x^2 \\ a^2[x^2 + 2cx + c^2 + y^2] &= a^4 + 2a^2cx + c^2x^2 \\ a^2x^2 + 2a^2cx + a^2c^2 + a^2y^2 &= a^4 + 2a^2cx + c^2x^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} a^2x^2 - c^2x^2 + a^2y^2 &= a^4 - a^2c^2 \\ (a^2 - c^2)x^2 + a^2y^2 &= a^2(a^2 - c^2) \end{aligned}$$

Dividiendo para $a^2(a^2 - c^2)$

$$\begin{aligned} \frac{x^2(a^2 - c^2)}{a^2(a^2 - c^2)} + \frac{a^2y^2}{a^2(a^2 - c^2)} &= \frac{a^2(a^2 - c^2)}{a^2(a^2 - c^2)} \\ \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} &= 1 \end{aligned}$$

Finalmente, llamando $b^2 = a^2 - c^2$ tenemos:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Ecuación canónica de la elipse con centro $O(0,0)$ y eje focal horizontal


“ b ” representa la longitud del **semieje menor**, Observa la gráfica anterior. Aquí el **lado recto** tiene dimensión $\boxed{\frac{2b^2}{a}}$. ¡Demuéstralos!

Para los casos generales tenemos:

Suponga que el vértice es el punto $V(h, k)$, y que el **eje focal sea horizontal** entonces su ecuación sería:

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

Y su gráfica sería:




Observación:

La dirección del eje focal está indicada por el término que tiene el mayor denominador, en este caso sería el valor de “ a^2 ”. Observe también que $a > b$.

Por lo tanto, si el **eje focal fuese vertical**, su ecuación sería:

$$\frac{(y-k)^2}{a^2} + \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$$

Y su gráfica sería:



Ejemplo 1

Graficar la Elipse que tiene por ecuación $25x^2 + 16y^2 + 100x - 96y - 156 = 0$. Indique todos sus elementos.

Solución

La ecuación general dada, la transformamos a la ecuación canónica completando cuadrados

$$\begin{aligned} 25(x^2 + 4x + 4) + 16(y^2 - 6y + 9) &= 156 + 100 + 144 \\ 25(x+2)^2 + 16(y-3)^2 &= 400 \end{aligned}$$

Ahora dividimos para 400

$$\begin{aligned} \frac{25(x+2)^2}{400} + \frac{16(y-3)^2}{400} &= \frac{400}{400} \\ \frac{(x+2)^2}{16} + \frac{(y-3)^2}{25} &= 1 \end{aligned}$$


La última ecuación nos indica que la elipse tiene:

1. Centro $0(-2,3)$
2. Eje focal vertical, debido a que el mayor denominador está sobre el término que contiene a "y". Entonces $a^2 = 25 \Rightarrow a = 5$
3. $b^2 = 16 \Rightarrow b = 4$

4. Lo anterior nos permite calcular el valor de c .

$$\begin{aligned} c &= \sqrt{a^2 - b^2} \\ c &= \sqrt{25 - 16} \\ c &= \sqrt{9} \\ c &= 3 \end{aligned}$$

Por lo tanto la gráfica sería:




Ejemplo 2

Hallar la ecuación general de la Elipse cuya eje mayor mide 20 unidades y los focos son los puntos de coordenadas $(0, 5\sqrt{3})$ y $(0, -5\sqrt{3})$.

SOLUCIÓN:

Primero representamos en el plano cartesiano los puntos dados.



Observamos que la elipse tiene como eje focal, el eje y, que $c = 5\sqrt{3}$.

Como nos dicen que el eje mayor mide 20 unidades, entonces $a = 10$

Esto, nos permite calcular b :

$$b^2 = a^2 - c^2$$

$$b^2 = (10)^2 - (5\sqrt{3})^2$$

$$b^2 = 100 - 75$$

$$b^2 = 25 \Rightarrow b = 5$$

Finalmente la ecuación de la elipse sería:

$$\frac{y^2}{100} + \frac{x^2}{25} = 1$$


$$4x^2 + y^2 = 100$$

Ejemplo 3

Una pista de carros tiene forma de elipse, el eje mayor mide 10 km. Y el eje menor 6 km. Determine la distancia a que se encuentra un carro del centro de la pista en el momento en que pasa a la altura de uno de los focos.

Solución

Representando en el plano cartesiano la información proporcionada, tenemos:




La ecuación de la elipse sería: $\frac{x^2}{5^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1$

Como $a = 5$ y $b = 3$ entonces $c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 9 = 16$
 $c = 4$

La ecuación de la elipse sería: $\frac{x^2}{5^2} + \frac{y^2}{3^2} = 1$

Como $a = 5$ y $b = 3$ entonces $c^2 = a^2 - b^2 = 25 - 9 = 16$
 $c = 4$

La dimensión de la altura de uno de los focos a la elipse es la mitad de la dimensión del lado recto



EJERCICIO 03. Realiza lo que se te indica en cada uno de los ítems. Desarrolla tus procedimientos con lápiz y al final escribir tu respuesta con lapicero color negro.

1. Grafique el lugar geométrico definido por cada una de las siguientes ecuaciones: (Indique todos sus elementos).
 - a. $4x^2 + 9y^2 - 16x + 18y - 11 = 0$
 - b. $9x^2 + 4y^2 + 18x - 16y - 11 = 0$
2. Si los focos de una elipse son los puntos $F_1 = (-4,3)$, $F_2 = (2,3)$ y el perímetro del triángulo cuyos vértices son los focos y un punto de la elipse, es igual a 16, determine la ecuación de la elipse.
3. El arco de un puente es semielíptico, con eje mayor horizontal. La base tiene 30 m. y su parte más alta con respecto a la tierra es 10 m. Determine la altura del arco a 6 m. del centro de la base.
4. Determine los valores de k para que la ecuación $x^2 + 2y^2 + 2x + 12y = k$ describa una elipse.
5. La Tierra gira alrededor del Sol siguiendo una órbita elíptica con excentricidad igual a 0.0172 y eje mayor de 299×10^6 Km. Si el sol está ubicado en uno de los focos de la elipse, determine la mayor y la menor distancia entre la Tierra y el Sol. (NOTA: excentricidad $e = \frac{c}{a}$)

HIPÉRBOLA

Definición:


Sean F_1 y F_2 dos puntos del plano y sea a una constante positiva. La Hipérbola se define como el conjunto de puntos $P(x, y)$ del plano tales que el valor absoluto de la diferencia de su distancia a F_1 con su distancia a F_2 es igual a $2a$. Es decir:

$$\text{Hipérbola} = \{P(x, y) / |d(P, F_1) - d(P, F_2)| = 2a\}$$

A F_1 y F_2 se les denomina **focos de la hipérbola**.

Ecuación canónica:

Sean $F_1(-c, 0)$ y $F_2(c, 0)$, observa el gráfico:



De la definición tenemos:

$$|d(P, F_1) - d(P, F_2)| = 2a$$

$$\sqrt{(x+c)^2 + (y-0)^2} - \sqrt{(x-c)^2 + (y-0)^2} = 2a$$

Despejando un radical, elevando al cuadrado y reduciendo términos semejantes:

$$\begin{aligned} (\sqrt{(x+c)^2 + y^2})^2 &= (2a + \sqrt{(x-c)^2 + y^2})^2 \\ (x+c)^2 + y^2 &= 4a^2 + 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2 \\ x^2 + 2xc + c^2 + y^2 &= 4a^2 + 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + x^2 - 2xc + c^2 + y^2 \\ 4cx - 4a^2 &= 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} \end{aligned}$$

Dividiendo para 4, elevando al cuadrado y reduciendo términos semejantes:

$$\begin{aligned} (cx - a^2)^2 &= (a\sqrt{(x-c)^2 + y^2})^2 \\ c^2x^2 - 2a^2cx + a^4 &= a^2[(x-c)^2 + y^2] \\ c^2x^2 - 2a^2cx + a^4 &= a^2[x^2 - 2cx + c^2 + y^2] \\ c^2x^2 - 2a^2cx + a^4 &= a^2x^2 - 2a^2cx + a^2c^2 + a^2y^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c^2 x^2 - a^2 x^2 - a^2 y^2 &= a^2 c^2 - a^4 \\ (c^2 - a^2) x^2 - a^2 y^2 &= a^2 (c^2 - a^2) \end{aligned}$$

Dividiendo para $a^2(c^2 - a^2)$

$$\frac{x^2(c^2 - a^2)}{a^2(c^2 - a^2)} - \frac{a^2 y^2}{(c^2 - a^2)} = \frac{a^2(c^2 - a^2)}{a^2(c^2 - a^2)}$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{c^2 - a^2} = 1$$

Finalmente, llamando $b^2 = c^2 - a^2$ tenemos:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

Ecuación canónica de la hipérbola con centro $O(0,0)$
y eje focal horizontal


Aquí "b" representa la longitud del segmento (Observe la gráfica anterior) llamado **semieje conjugado**.

Para los casos generales tenemos:

Suponte que el vértice es el punto $V(h, k)$, y que el eje focal sea horizontal entonces su ecuación sería:

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$$

Y su gráfica sería:




Observación:

La dirección del eje focal está indicada por el término positivo y además sobre este término estará " a^2 ". Por lo tanto, si el eje **focal fuese vertical**, su ecuación sería:

$$\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$$

Y su gráfica sería:



Ejemplo 1

Graficar la hipérbola que tiene por ecuación $x^2 - 3y^2 + 2x + 6y - 1 = 0$. Indique coordenadas de los vértices, coordenadas de los focos y ecuaciones de las asíntotas.

SOLUCIÓN:

Agrupando y completando cuadrados para darle la forma canónica a la ecuación:

$$\begin{aligned}
 (x^2 + 2x + 1) - 3(y^2 - 2y + 1) &= 1 + 1 - 3 \\
 (x+1)^2 - 3(y-1)^2 &= -1 \\
 3(y-1)^2 - (x+1)^2 &= 1 \\
 \frac{(y-1)^2}{\frac{1}{3}} - \frac{(x+1)^2}{1} &= 1
 \end{aligned}$$

Se concluye que:

- La hipérbola tiene eje focal vertical, debido a que el término positivo es el que contiene a "y".


$$2. \quad a^2 = \frac{1}{3} \Rightarrow a = \sqrt{\frac{1}{3}}$$

$$3. \quad b^2 = 1 \Rightarrow b = 1$$

El valor de c se lo calcula empleando la fórmula $c = \sqrt{a^2 + b^2}$, es decir:

$$c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{\frac{1}{3} + 1} = \sqrt{\frac{4}{3}} = 2\sqrt{\frac{1}{3}}$$

Por lo tanto su gráfica sería:



Las ecuaciones de las asíntotas se determinan igualando a cero la ecuación canónica:


$$\begin{aligned} 3(y-1)^2 - (x+1)^2 &= 0 \\ 3(y-1)^2 &= (x+1)^2 \\ \sqrt{3(y-1)^2} &= \sqrt{(x+1)^2} \\ \sqrt{3}\sqrt{(y-1)^2} &= \pm(x+1) \\ y-1 &= \frac{\pm(x+1)}{\sqrt{3}} \\ y &= 1 \pm \frac{(x+1)}{\sqrt{3}} \end{aligned}$$

Ejemplo 2

Hallar la ecuación general de la cónica que tiene por focos los puntos $(1,3)$ y $(7,3)$; y por vértices los puntos $(2,3)$ y $(6,3)$

SOLUCIÓN:

Representando los focos y vértices en el plano cartesiano, sacamos las conclusiones necesarias para plantear la ecuación buscada



Del gráfico se observa que:

1. El eje focal debe ser horizontal.
2. El centro tiene coordenadas $0(4,3)$.
3. $a = 2$ y $c = 3$

El valor de b se calcula empleando la formula $b = \sqrt{c^2 - a^2}$, es decir:

$$b = \sqrt{c^2 - a^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$$


Ahora hallando la ecuación de la hipérbola, tenemos:

$$\begin{aligned} \frac{(x-4)^2}{4} - \frac{(y-3)^2}{5} &= 1 \\ 5(x^2 - 8x + 16) - 4(y^2 - 6y + 9) &= 20 \\ 5x^2 - 40x + 80 - 4y^2 + 24y - 36 - 20 &= 0 \\ 5x^2 - 4y^2 - 40x + 24y + 24 &= 0 \end{aligned}$$

EJERCICIO 04. Realiza lo que se te indica en cada uno de los ítems. Desarrolla tus procedimientos con lápiz y al final escribir tu respuesta con lapicero color negro.

1. Grafique el lugar geométrico definido por cada una de las siguientes ecuaciones: (Indique todos sus elementos).

- a. $4x^2 - 9y^2 - 16x + 18y - 9 = 0$
b. $9x^2 - 4y^2 + 18x - 16y - 9 = 0$
2. Determine la ecuación de las asíntotas de la hipérbola definida por $4x^2 - 3y^2 + 8x + 16 = 0$.
3. Determine la ecuación de la recta que contiene al centro de la hipérbola cuya ecuación es $4x^2 - y^2 + 32x - 8y + 49 = 0$ y es perpendicular a la recta definida por la ecuación $2x - 9y + 3 = 0$.
4. Determine la distancia entre los vértices de la cónica con ecuación $-9x^2 + 18x + 4y^2 + 24y = 9$
5. Si una hipérbola, una circunferencia de radio 5 y el rectángulo ABCD de lado $AB = 6$, están ubicados en el plano cartesiano como se muestra en la figura, determine la distancia entre los vértices de la hipérbola.




Otras regiones del plano, importantes a considerar, serían aquellas que están definidas por **inecuaciones**.

Ejemplo 1


SOLUCIÓN:

Grafique la región del plano $R = \{(x, y) / y > x^2 - 4\}$




Ejemplo 2

Grafique la región del plano $R = \{(x, y) / x^2 + y^2 \leq 4\}$


**Ejemplo 3**

Grafique la región del plano $R = \{(x, y) / x^2 - y^2 \leq 1\}$




Ejemplo 4

Grafique la región del plano $R = \{(x, y) / x^2 - 4 \leq y \leq 2x - 1\}$

**Ejemplo 5**

Grafique la región del plano $R = \{(x, y) / -\sqrt{4 - x^2} \leq y \leq -\frac{1}{2}x + 2\}$



EJERCICIO 05. Realiza lo que se te indica en cada uno de los ítems. Desolla tus procedimientos con lápiz y al final escribir tu respuesta con lapicero color negro.

1. Si $p(x, y) : \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} \leq 1$, grafique $Ap(x, y)$.

2. Grafique las regiones en el plano definidas por:

$$1. \quad 3x^2 + 5y^2 \leq 9$$

$$2. \quad x^2 + y^2 \geq 16$$

$$3. \quad \frac{x^2}{18} + \frac{y^2}{9} < 1$$

$$4. \quad \frac{x^2}{25} - \frac{y^2}{100} \geq -1$$

3. Grafique en el plano el conjunto solución de los siguientes sistemas:

$$1) \quad \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 16 \\ x + y \geq 2 \end{cases}$$

$$2) \quad \begin{cases} x^2 + y^2 > 1 \\ x^2 + y^2 < 4 \end{cases}$$

EJERCICIO GENERAL

1. Grafique el lugar geométrico definido por cada una de las siguientes ecuaciones: (indique vértices, focos, centros asintotas)

$$1. \quad y^2 + 4y - 6x + 22 = 0$$

$$2. \quad 3x^2 - 5y^2 + 6x + 10y = 32$$

$$3. \quad x^2 + y^2 - 12x - 12y + 36 = 0$$

$$4. \quad x^2 + 3y^2 + 6x + 6 = 0$$

$$5. \quad x^2 + y^2 + 4x - 3y + 9 = 0$$

$$6. \quad 9x^2 - 4y^2 - 54x + 8y + 113 = 0$$

$$7. \quad 4x^2 + 9y^2 - 8x = 32$$

$$8. \quad (y-1)^2 = 2x + 4$$

$$9. \quad x^2 - 4x - 4y = 0$$

$$10. \quad x^2 - 4x + y^2 - 16y + 4 = 0$$

$$11. \quad 25x^2 + 16y^2 + 100x - 96y - 156 = 0$$

$$12. \quad y^2 - 4y - 8x + 28 = 0$$

$$13. \quad 4x^2 - 3y^2 + 8x + 16 = 0$$

2. Califique como Verdadera o falsa cada una de las proposiciones. Justifique formalmente su respuesta.

a. La ecuación $x^2 + y^2 + ax + by = c$ representa una circunferencia para todos los números reales diferentes de cero a,b,c.

b. La distancia entre los focos de la gráfica de $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ es $2\sqrt{a^2 - b^2}$

c. La ecuación $x^2 + y^2 - 2kx + 4 = 0$ describe una circunferencia si y sólo si $k \in (-\infty, -2) \cup (2, +\infty)$

d. El vértice de una parábola es el foco de la otra parábola y viceversa, si la ecuación de una de ellas es $y^2 - 2y - 4x + 1 = 0$, entonces la ecuación de la otra parábola es $y^2 + 2y + 2x - 4 = 0$

e. La cónica de ecuación $y = x^2 + 2x - 1$, tiene su foco en $(1, 0)$.

f. Sea la parábola P , cuya ecuación es $P: 2y^2 - 3y + 5x + 2 = 0$, su foco tiene por coordenadas $F_0\left(-\frac{107}{40}, \frac{3}{4}\right)$

g. Sea la ecuación $Ax^2 - 2y^2 + 3x - 2y = 0$ con $A \neq 0$; la ecuación describe una hipérbola.

3. Determine la ecuación de la circunferencia que tiene como centro el vértice de la parábola que tiene por ecuación $x + 3y^2 - y = 0$, y contiene al foco de la misma.
4. Una circunferencia tiene por ecuación $x^2 + (y - 2)^2 = 1$. La recta de ecuación $y = kx$ donde $k \in R$, es tangente a la circunferencia. Halle todos los valores posibles de k .
5. Determine la ecuación del conjunto de puntos $P(x, y)$ tales que la suma de la distancia de P a los puntos $(-4, 0)$ y $(4, 0)$ es 14.
6. Determine la ecuación del lugar geométrico de los puntos $P(x, y)$ tales que la distancia al punto $(1, -3)$ es dos veces la distancia a la recta definida por la ecuación $x - 4 = 0$.
7. Un avión sigue una trayectoria tal que su distancia a una estación de radar situada en el punto $(2, 0)$ es igual a un tercio de su distancia a una carretera que sigue el trayecto de la recta definida por $x = -2$. Determine la ecuación de la trayectoria que sigue el avión.
8. Determine la ecuación del lugar geométrico compuesto de puntos $P(x, y)$ que cumplen con la condición de que su distancia al eje 'y' es el doble que su distancia al punto $(2, -3)$.
9. Un punto se mueve de tal manera que su distancia al punto $(2, -2)$ es siempre igual a un tercio de su distancia al punto $(4, 1)$. Determine la ecuación del lugar geométrico,
10. Determine la ecuación general del lugar geométrico definido por el conjunto de puntos (x, y) ubicados en el plano tales que la distancia al punto $(-1, -2)$ es el doble de la distancia a la recta definida por la ecuación $x - 3 = 0$.

INFORMACIÓN (INCLUÍDA LA VERSIÓN ANTERIOR DE ESTE DOCUMENTO EDUCATIVO) TOMADA DE:**Sitios web:**

1. <https://www.guao.org/sites/default/files/Operaciones%20Combinadas%20con%20Fracciones%20Algebraicas..pdf>
2. <https://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/781/3/1487.pdf>
3. https://usuarios.fceia.unr.edu.ar/~ugarte/Algebra%20y%20Geometria%20Analitica/Conicas/Secciones%20%20c%F3nicas_2018.pdf

INFORMACIÓN (INCLUÍDA EN LA NUEVA ERSIÓN DE ESTE DOCUMENTO EDUCATIVO) TOMADA DE:**Sitios web:**

1. <https://economipedia.com/definiciones/geometria-analitica.html>